



Voor de patiënt

## Afname-instructies: Spermaonderzoek



## Richtlijnen voor de patiënt

Onderzoek van een spermastaal is enkel mogelijk wanneer het staal volgens welbepaalde voorschriften is bekomen en vervoerd.

Wanneer u aan de voorschriften niet kunt voldoen, kan geen betrouwbaar resultaat van de analyses worden gegarandeerd.

Procedure:

- Vooraf 3 dagen seksuele onthouding.
- Eerst urine lozen.
- Daarna de handen en de genitale streek goed wassen met water en zeep, de zeep afspoelen en alles afdrogen met een verse handdoek. Werp de handdoek na gebruik in de wasmand.
- Het spermastaal opwekken enkel door masturbatie.
- Het spermastaal rechtstreeks lozen in het speciale potje dat u daartoe hebt meegekregen.
- Het potje goed afsluiten door de dop volledig dicht te draaien.
- Met de dop naar boven het potje onmiddellijk onder de trui of onder de vest naar het laboratorium brengen. Het staal moet immers op lichaamstemperatuur gehouden worden en houdt u dus best zo dicht mogelijk tegen het lichaam.
- Het spermastaal dient binnen 1 uur na de lozing te worden onderzocht.
- Gelieve bij het afgeven van het staal nauwkeurig het ogenblik van de zaadlozing en het aantal dagen onthouding te vermelden.
- Tevens dient u te vermelden of, per ongeluk, een gedeelte van het spermastaal verloren is gegaan.

Indien u niet kan voldoen aan deze voorwaarden, bieden wij u steeds de mogelijkheid om een spermastaal in het laboratorium aan te maken in een hiervoor voorzien lokaal.

Dit onderzoek kan niet worden uitgevoerd tijdens de wachtdiensten of op verlofdagen.

Bij twijfel wordt best vooraf telefonisch contact opgenomen met het laboratorium.